4159

Magazin des Thierreichs
V. 1 1793 pp 128-134 Reich, G. C.

XXVI. *Kurze Beſchreibung verſchiedener neuen, oder noch wenig bekannten Thiere, welche Herr Le Blond der naturforſchenden Geſellſchaft zu Paris aus Cayenne als Geſchenk überſchikt hat* *).

(Actes de la Societé d'Hiſtoire naturelle de Paris. T. I. p. 115. etc.)

I. QUADRUPEDA **).

Primates.

Veſpertilio (*barbipes*) caudatus niger, auribus plicatis, ſubcoadunatis, pedibus poſterioribus apice barbatis. —

Chauve-ſouris de la Guyanne. Buff. Suppl. 7. p. 294. t. 75.

Ferae.

Canis (*tetradactylus*) cauda recta, nigra, ſubtus rufa, pedibus tetradactylis.

(*Vulgo*) *Chien ſauvage de Cayenne.*

Viverra (*cancrivora*), ſupra fuſco adſperſa, infra flavo-fulva; capite cinereo, macula nigricante oculis circumacta. —

(*Vulgo*) *Chien crabier de Cayenne.*

An Viv. Narica junior, cauda nondum annulata?

Didelphis (*flaveſcens*) flaveſcens cauda baſi piloſa corpore longiore, orbitis antice fuſcis; linea fuſca a naſo ad occiput.

AVES ***).

Falco (*diſcolor*) ſuper, univerſe ſaturate griſeus; ſubtus, pectore, abdomine, cruribusque ſaturate ferrugineis: tectricibus inferioribus caudae et alarum albis.

Lanius

*) Das vollſtändige Verzeichniſs der an die Geſellſchaft geſchikten Säugthiere, Vögel, Amphibien, Inſekten und Konchylien hier zu liefern, halte ich für höchſt überflüſſig. Ich hebe daher blos diejenigen aus, die noch nicht bekannt ſind. *R.*

**) Dieſe ſind von Herrn *Alexander Brongniart* beſchrieben worden.

***) Ihre Beſchreibung rührt von den Herren *Richard* und *Bernard* her.

Lanius (*ferruginatus*) ſupra totus ſaturate ferrugineus; ſubtus dilute rufeſcens; remigibus introrſum nigricantibus: fronte ſubcriſtato ferrugineo: occipite, genisque variegatis.

Picae.

Picus (*nigro-flavus*), capite, collo, ſummoque dorſo nigris; remigibus intimis pectoreque flavescentibus nigricante admixto, interioribus ruſis: rectricibus nigricantibus.

Trochilus [*elegans*] *) ſuper viridis ſubaureo-micans: gutture viridi micante, rectricibus utrinque violaceis, ſummitate duabusque mediis coeruleo-nigricantibus.

Trochilus [*ferruginatus*] collo, corporeque utrinque viridibus: gutture aureo-micante: tectricibus alarum interioribus et quatuor rectricum ferrugineis.

Trochilus [*variegatus*] ſuper ima fronte, rectricibus alarum caudaeque viridibus: collo utrinque, pectore et abdomine rubello aureoque micantibus: gutture viridi micante: rectricibus alarum interioribus ferrugineis.

Trochilus [*notatus*] ſuper univerſe viridis, ſubtus viridis micans, ſummo gutture coeruleo-micante. Retricibus omnibus utrinque chalybaeo-coeruleis.

Anſeres.

Larus (*griſeolus*) ſupra albido-cinereſcens; ſubtus totus albus: remigibus ſupra griſeo-nigricantibus: roſtro pedibusque nigris.

Larus [*frontalis*]. *Hirondelle de Mer brune de la Louiſiane. Buff. enlum.* 997.

Univerſe obſolete griſeus, fronte ſubalbida; roſtro longiore rectiusculo nigro.

Grallae.

Ardea (*griſeo-alba*) ſuper fuſceſcenti griſea. Pectore, ventre, cruribus, tectricibus inferioribus caudae et alarum candidis: collo ſubtus ferrugineo variegato.

Ardea (. . . .) Linn. (Actes etc. no. 60.)

*) Die mit Klammern bezeichneten Trivialnamen ſind von mir gewählt. *R.*

Scolopax (*bicolor*). *Petite Bécaſſine de Mer.*

Super ſubolivaceo-griſea; ſubtus ſordide alba, alis tamen caudaque partim griſeis: roſtro, capite ſesqui-longiore, pedibus luteis.

Paſſeres.

Columba (*rufaxilla*) ſupra tota griſeo-fuſca; abdomine ſubalbido; tectricibus inferioribus alarum ſaturate ferrugineis: rectricibus infimis apice albis.

Turdus (. . .) affinis T. ſenegalenſi. Linn. ed. Gmel. pag. 823.

Loxia (*ſemitorquata*) ſupra griſeo-nigricans; capite, rectricibusque nigris: alis griſeo-marginatis et albo-ſubmaculatis: ſubtus griſeo-albidus; torque concolore incompleto.

Tanagra (. . . .) *Tangara de la Guyane. Buff. enlum.* 742. (Actes etc. no. 86.)

Tanagra (. . . .) *Tangara pourpré de Cayenne. Buff. enlum.* 128. fig. 1. (Actes etc. no. 93.)

Tanagra (. . . .) *Femelle du Tangara pourpré de Cayenne. Buff. enlum.* 128. fig. 2. (Actes etc. no. 94.)

Tanagra (. . . .) *Tangara à tête rouſſe de Cayenne. Buff. enlum.* 290. fig. 1. (Actes etc. no. 95.)

Fringilla (. . . .) affinis Fringillae domeſticae. Linn. edit. Gmel. pag. 925. (Actes etc. no. 96.)

INSECTA *).

Eleuterata.

Scarabaeus [*clavatus*] ſcutellatus muticus piceus, clava antennarum majori elongata.

Magnitudo *Scar. Philoctet. Oliv.*

Helops *Nigrita* Fabr.?

Tenebrione molitore duplo major. Corpus ſupra atrum, ſubtus piceum. Thorax ſubquadratus. Elytra ſtriata, ſtriis punctatis.

Helops [*aeneus*] niger, elytris nigro-aeneis, violaceo-nitentibus.

Erotylus [*marginatus*] flaveſcens, elytris nigro-violaceis, flavo marginatis.

Melo-

*) Beſchrieben von Herrn *Olivier.*

Melolontha [*irregularis*] pallide teſtacea, elytris maculis irregularibus flaveſcentibus.

Melolontha ruſtica paulo minor. Corpus totum pallide teſtaceum, tarſis fuſcis, maculisque irregularibus flavis ſupra elytra.

Prionus [*nobilis*] thorace unidentato, viridi-coeruleus, nitidus, tibiis poſticis compreſſis.

Oliv. Ent. Prion. tab. 3. *fig.* 10.

Lamia [*unifaſciata*] cinerea, elytris faſcia lata alba, punctis nigris elevatis notata.

Staphylinus [*abdominalis*] capite thoraceque nigro-coeruleis, corpore nigro, abdomine apice fulvo.

Magnitudo et ſtatura *Staphylini maxilloſi.* Alae fuſcae.

Ulonata.

Forficula [*thoracica*] nigra, thorace flavo, forcipe ſimplici.

Mantis (. . . .) corpore fuſco lineari longiſſimo. (Larva).

Piezata.

Sphex [*Olivieri*] atro-coeruleſcens, antennis alisque fuſco-ferrugineis.

Magnitudo et ſtatura *Sph. Druryi* (Illuſtrations of Inſects Tom. III. tab. 1.). At in ſpecimine noſtro pedes corpore concolores; alae fuſco-ferrugineae immaculatae. Petiolus breviſſimus.

Sphex [*biſpinoſa*] glabra viridi-coerulea nitida, thorace poſtice biſpinoſo.

Magnitudo media. Mandibulae arcuatae nigrae. Thorax poſtice ſpinis duabus validis acutis armatus. Pedes corpore concolores. Alae fuſceſcentes. Petiolus brevis.

Sphex [*coeruleſcens*] atro-coeruleſcens, alis nigro-violaceis.

Magnitudo media. Petiolus breviſſimus.

Sphex [*ſplendida*] nigra, thorace tomento fugaci aureo, antennis verſus apicem fulvis.

Magnitudo media. Petiolus brevis.

Sphex [*tricolor*] nigra, abdomine pedibusque ferrugineis, alis violaceis.

Sph. fabuloſa major et craſſior; petiolus breviſſimus.

Veſpa [*cayana*] abdomine petiolato, corpore fuſco-flaveſcente, alis fuſcis.

Veſpa [*picipes*] nigra, antennis pedibusque piceis.

Apis [*obſcura*] hirſuta atra, alis fuſcis.

Apis [*abdominalis*] hirſuta fulva, abdomine fuſco, ano ruſeſcente.

Frons flava, thorax hirſutus fulvus. Alae fuſceſcentes.

Apis [*zonaria*] fuſca, abdomine faſciis fuſco-flaveſcentibus.

Apis [*frontalis*] thorace cinereo hirto, abdomine fuſco ferrugineo, fronte flavo-maculata.

Formica [*ovata*] nigra nitida, abdomine oblongo-ovato.

Similis *Formicae aculeatae Oliv.*, at thorax laevis et abdomen ovato-oblongum.

Formica [*octoſpinoſa*] fuſco-ferruginea, capite thorace multiſpinoſis, abdomine tuberculato.

Caput magnum ſpinis tuberculisque plurimis armatum. Thorax octoſpinoſus. Abdomen tuberculatum.

Formica [*melanophthalma*] rufa inermis, oculis nigris.

Formica [*picipes*] nigra, pedibus piceis.

Formica [*tomentoſa*] nigra tomento fugaci aureo tecta, pedibus piceis.

Odonata.

Libellula [*immaculata*] ferruginea, alis immaculatis.

Similis *L. depreſſae*, et alae immaculatae, puncto ordinario marginali nigro. Corpus fuſco-ferrugineum.

Libellula [*cayana*] alis albis, abdomine flaveſcente nigrofaſciato.

Libellula [*angulata*] alis albis apice fuſcis.

Agrion [*variegata*] alis albis immaculatis, corpore rubro variegato.

Agrion [*Caja*] alis albis, baſi rubris.

Libellula Caja, *Drury Illuſtr. tab.* 45. *f.* 2.

Agrion [*angulata*] alis reticulatis hyalinis apice albis; corpore lineari elongato.

Unogata.

Phalangium [*variegatum*] fuſco-ferrugineum, ſupra flavo-variegatum, poſtice ſpinis duabus erectis armatum.

Pha-

Phalangium [*ſpinoſum*] lividum, poſtice ſpinis duabus erectis armatum; palpis elongatis, apice incraſſatis, ſpinoſis.

Gloſſata.

Phalaena [*ſubconcolorata*] antennis ſetaceis, alis nigris; anticis vitta abbreviata maculaque apicis transverſis flavis.

Parva, alae poſticae nigrae, limbo margineque interiore flavis. Subtus alae omnes concolores. Corpus nigrum utrinque vitta flava.

Ryngota.

Tettigonia [*punctata*] capite, thorace, elytrisque nigris flavo-punctatis.

Caput ſupra nigrum, vertice puncto flavo. Thorax niger, punctis duobus flavis. Scutellum nigrum, puncto flavo. Elytra nigra, ſingulo punctis ſex flavis. Alae nigrae, immaculatae. Corpus ſubtus pedesque flava.

Tettigonia [*thoracica*] thorace nigro, capite elytrisque fuſco-purpureis. *Stoll. Cicad. tab.* 21. *fig.* 112.

Cimex [*ſcutellum*] ovatus, thorace ſpinoſo nigro antice flavo, ſcutello flavo macula media nigra.

Similis *Cim. albicolli.* Caput flavum antice nigro-marginatum. Elytra nigra immaculata. Corpus ſubtus flavum nigro-maculatum. Pedes nigri.

Cimex [*feriatus*]. *Stoll. Cim. tab.* 28. *fig.* 194.

Antennae nigrae articulo ultimo flavo. Caput nigrum. Thorax muticus niger linea media marginibusque lateralibus rubris. Scutellum nigrum apice punctoque baſeos rubris. Elytra nigra. Corpus ovatum ſubtus nigrum, abdominis margine punctisque utrinque ſeriatis rubris. Pedes nigri.

Cimex [*unipunctatus*] niger elytris puncto minutiſſimo albo.

Magnitudo media. Antennae nigrae articulis duobus ultimis flaveſcentibus. Corpus ovatum muticum nigrum, roſtro tarſisque fuſcis. Elytra puncto minutiſſimo notata. Thorax antice utrinque ſubauriculatus.

Cimex [*undatus*] oblongus fuſcus elytris ſtriga undata punctoque cinereis.

Minor. Pedes cinereo-annulati.

Cimex [*clavatus*] oblongus, thorace ſpinoſo, fuſco-rufeſcens, femoribus poſticis clavatis dentatis nigro-maculatis.

Magnitudo et ſtatura *Lyg. calcarati*; at differt thorace ſpinoſo, abdomine ſupra concolore, femoribus poſticis craſſioribus minus dentatis et nigro-maculatis.

Cimex [*verticalis*]. *Stoll. Cim. tab.* 41. *fig.* 294.

Caput nigrum linea verticis flava. Thorax niger, maculis quinque flavis. Scutellum nigrum baſi apiceque flavum. Elytra hyalina nigro-venoſa. Pectus nigrum flavo-variegatum. Abdomen pedesque pallide rufa.

Reduvius [*fiſſus*] niger, elytris fuſcis rubro-venoſis, ſcutello apice fiſſo.

Magnus. Antennae fuſcae articulo primo nigro. Caput, thorax, ſcutellum, corpus ſubtus nigra fuſco-ferrugineo-varia. Thorax poſtice rubro-faſciatus. Scutellum nigrum apice emarginatum aut fiſſum.